

# ПАНАНГИН® ФОРТЕ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД на известный бренд

Уже не одно десятилетие сердечно-сосудистые заболевания стабильно занимают лидирующие позиции в качестве причин смертности. Большинство случаев внезапной смерти происходит в результате нарушения ритма сердечной деятельности, в основе чего лежит острый дефицит калия и магния<sup>1</sup>.

140



HEART RATE

>Lorem ipsum dolor sit amet, elit nibil per leo, pra in auguria praesent. Pra eu andra iustitiae, simul conuenia adstantur eu leo. Et omnia omnia meo, ut non sint erat, non aliquid conuenit. Metuendo meo, leo. Lorem aliquam id, ex non tamen videtur, vad id tabulae iudectae.

Sim et nullis vituperata tectumque, iustitiae omittantur: vixit hincque non meo. In teque aliquid conuenit, non ex propterea conuenit. Prae omnia conuenit factis et. Si terra rationibus ex vixit, ut quae conuenit meo, ex vixit hinc vituperata.

>Lorem ipsum dolor sit amet, elit nibil per leo, pra in auguria

При высокоскоростном ритме жизни люди нередко упускают из виду первые, малозаметные признаки нарушения баланса этих микроэлементов. Его своевременному восстановлению, вероятно, мешают мифы о малой значимости калия и магния для укрепления сердечной мышцы.

**МИФ ПЕРВЫЙ**

*Микроэлементы калий и магний нужны организму только для поддержания общего самочувствия*

Достаточное количество и оптимальное соотношение магния и калия в организме – это в первую очередь залог нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Калий играет ведущую роль в сокращении клеток миокарда и передаче нервных импульсов, магний – это универсальный регулятор биохимических процессов, участвует в процессе расслабления мышечного волокна.

**Дефицит калия** может быть обусловлен повышенным выведением с мочой (в том числе при приеме петлевых и тиазидных диуретиков) или снижением всасываемости из ЖКТ, при острых формах диареи и рвоты. Клинически это может выражаться в слабости, усталости и пароксизмальными нарушениями ритма сердца<sup>1</sup>.

**Дефицит магния** может быть вызван недостатком потребления с пищей, в том числе связанным с нарушением всасывания при заболеваниях ЖКТ, при хронических стрессовых состояниях, патологических процессах в почках, гипертиреозе.

Характеризуется нарушениями сна, повышенной возбудимостью и синдромом хронической усталости. Со стороны сердечно-сосудистой системы – повышением ЧСС, диастолического АД и спазмом коронарных артерий<sup>1</sup>.

Особенно важно своевременное и достаточное поступление калия и магния в организм для людей с хроническими сердечно-сосудистыми патологиями – при нарушениях сердечного ритма, ишемической болезни сердца, после инфаркта миокарда, артериальной гипертензии и пр.

**МИФ ВТОРОЙ**

*Кардиологические заболевания требуют приема только «серьезных» лекарств, и роль микроэлементов в терапии сильно преувеличена*

Катионы калия (K<sup>+</sup>) и магния (Mg<sup>++</sup>) внутри клетки принимают активное участие в работе большого числа ферментов, играющих важную роль в механизме мышечной сократимости. Соотношение ионов калия, кальция, натрия и магния внутри и вне клетки влияет на сократимость миокарда, а также микроэлементы улучшают метаболизм сердечной мышцы. Нехватка калия и магния увеличивает предрасположенность к развитию артериальной гипертензии, атеросклероза коронарных артерий, аритмий и метаболических изменений в миокарде.

С целью восполнения дефицита калия и магния, улучшения состояния миокарда при различной сердечно-сосудистой



патологии долгие годы применяется препарат Панангин®, представляющий собой комплекс аспарагинатов магния и калия. Не так давно в аптеках появился новый препарат линейки – Панангин® Форте. Это «усиленный» новый Панангин®, который содержит лечебные дозировки аспарагинатов магния и калия<sup>2</sup>, в то время как классический препарат включает дозировки поддерживающие<sup>3</sup>. Таким образом, одна таблетка Панангин® Форте заменяет одну таблетку препарата Панангин®.

Калий и магний в препаратах Панангин® и Панангин® Форте содержатся в органической, естественной для человека, форме, в виде солей аспарагиновой аминокислоты. Это обуславливает высокую биодоступность и отличное усвоение микроэлементов клетками сердца, поскольку неорганические соединения калия и магния усваиваются хуже. Отличием нового препарата от классического является двойная дозировка активных веществ, специально сбалансированная для лечения ишемической болезни сердца и для коррекции нарушений ритма, а также большее количество таблеток в упаковке.

Эти лекарственные препараты имеют целый ряд общих показаний для устранения дефицита калия и магния при следующих состояниях:

- различные проявления ишемической болезни сердца (в том числе острый инфаркт миокарда) в комбинированной терапии<sup>4</sup>;
- сердечная недостаточность<sup>4</sup>;
- нарушения ритма сердца (в том числе аритмии, вызванные передозировкой сердечных гликозидов)<sup>4</sup>.

### Особенности рекомендации препарата Панангин® Форте

В аптеках на протяжении многих лет препарат Панангин® в виде таблеток пользуется заслуженной известностью и популярностью. Он широко назначается терапевтами, кардиологами как в качестве монопрепарата, так и в составе большинства комплексных схем лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

### Кому из посетителей аптеки можно предложить новый препарат Панангин® Форте?

В первую очередь это покупатели, хорошо знакомые с классическим препаратом, принимающие его постоянно. Новый Панангин® Форте будет для них более удобным для приема (одна таблетка на прием вместо двух).

На Панангин® Форте также можно обратить внимание покупателей, которые просят фармацевта посоветовать какое-либо средство для поддержания здоровья сердца. Преимущества препарата Панангин Форте в ценовой категории 300-500 рублей:

- Активные вещества (калия и магния аспарагинаты) хорошо изучены, за годы применения наработана обширная доказательная база, МНН препаратов Панангин® Форте и Панангин® входят в стандарты лечения сердечно-сосудистых заболеваний МЗ РФ<sup>5</sup>.
- Венгерская компания "Гедеон Рихтер", выпускающая препарат, давно присутствует на российском фармрынке

и зарекомендовала себя как производитель качественных лекарственных средств. Компания хорошо известна как медицинским специалистам, так и пациентам, что облегчает фармацевтическую консультацию.

- Аптечные работники могут рекомендовать посетителям Панангин® Форте как улучшенную версию классического препарата, обновленное лекарственное средство с удвоенной дозировкой активных веществ оптимизирует лечение (одна таблетка на прием вместо двух), позволяет принимать внутрь меньшее количество таблеток в течение суток и достигать аналогичного терапевтического эффекта.
- Панангин® Форте выпускается в упаковке № 60, а стандартная упаковка препарата Панангин® – № 50, с учетом двойной дозировки активных веществ в одной таблетке Панангин® Форте. Данная форма выпуска рассчитана на более длительный курс приема, что выгодно для пациента.

Своевременное пополнение запасов калия и магния в организме их комбинированными препаратами является необходимостью для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ценовая доступность и упрощение в применении являются дополнительными преимуществами для назначения нового «усиленного» препарата Панангин® Форте в стандартных схемах кардио терапии, включая хронические стадии. Знакомый многим пациентам бренд облегчает фармацевтическую рекомендацию. **Р**



<sup>1</sup> Шилов А.М., Мельник М.Б., Осия О.А., Князева С.А. Лечение ССЗ в практике врача первичного звена здравоохранения: место препаратов калия и магния (Панангин). МГМУ им. И.М. Сеченова // Кардиология, 2012; № 3: 102–107.

<sup>2</sup> Инструкция по медицинскому применению препарата Панангин® Форте, рег. №: ЛП-002814 от 13.01.2015.

<sup>3</sup> Инструкция по медицинскому применению препарата Панангин®, рег. №: П N013093/02 от 13.08.2007.

<sup>4</sup> Смирнова М.Д. Место Панангина в современной терапии ССЗ НДО Института клинической кардиологии им А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗ РФ, г. Москва // Кардиология, 2013; № 36: 1835–1839.

<sup>5</sup> Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012г. №1284н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при тахикардиях», Приказ МЗ РФ от 24 декабря 2012г. №1554н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности», Приказ МЗ РФ от 9 ноября 2012г. №708н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии».